

常见问题解答

1) 经直肠超声波引导活体组织检查会有哪些风险？

许多病人会在活体组织检查后，可能会发现他们的尿液及粪便内有血丝。出血通常比较轻微并且会逐渐缓解。但是，偶尔出血可能会比较严重。在此情况下，您可能需要住院观察。

您也可能无法排尿。在此情况下，我们将插入导尿管以排出尿液。

2) 我何时才会知道我的测试报告的结果？

我们的病理学家将会在显微镜下进一步的检验您前列腺的样本。检查结果不会当天出来。您将会在下次复诊时知道结果。

3) 如果报告证实有癌症，我该如何处理？

如果报告发现有癌症，我们将为您进行进一步的检查（例如骨扫描，磁共振扫描）来判断癌症是仅局限于前列腺还是已经扩散。

在所有检查结果明确之后，您的医生将会详细地与您讨论适当的治疗方式。

4) 如果报告没有癌症，我该如何处理？

如果报告证实没有癌症，您将会继续在诊所看医生，并须验血（如PSA）。一个没有癌症的报告并不能完全排除前列腺癌（有时活体组织检查不能发现微小的癌症）。因此，您必须按时到诊所看医生。您的医生将会建议您是否需要再次行进活体组织检查。

2 Simei Street 3 Singapore 529889
Tel: 6788 8833 Fax: 6788 0933
Reg No 198904226R

For appointments and enquiries,
please call the CGH Appointment Centre at
Tel: (65) 6850 3333

CGH Appointment Centre operating hours:
8.30 am to 8.00 pm (Monday to Friday)
8.30 am to 12.30 pm (Saturday & Sunday)
Closed on Public Holidays

For more information, please visit
<http://www.cgh.com.sg>



Organisation Accredited by
Joint Commission International



All information is valid at the time of printing (July 2015)
and subject to revision without prior notice.



经直肠超声波引导 活体组织检查(TRUS Biopsy)




什么是经直肠超声波引导活体组织检查？

经直肠超声波引导活体组织检查是利用超声波来进行的前列腺测试。您必须通过这测试来确定您是否患有前列腺癌。这可能是因为您的前列腺特异性抗原(PSA)检查结果异常。也可能是医生检查或者是影像学检查有异常。

这个过程需要大概20分钟。在此过程中，您的医生可以通过特制的超音波仪器检查您的前列腺，并从前列腺的不同部位取出样本来检测您是否患有前列腺癌。

经直肠超声波引导活体组织检查一般是日间手术。



我应该在测试前做什么样的预备工作？

您必须在进行测试前的六个小时停止进食。

如果您有便秘的问题，我们可能会利用泻药或灌肠来清除您大肠内的粪便。

如果您长期服用抗血小板或抗凝血药物，您可能必须停止服用它们来减低流血的可能性。您的医生将会告诉您需停用药物多久。

经直肠超声波引导活体组织检查是怎样进行的？

如果需从您的前列腺采集样本检查，您的医生将会给您使用抗生素及镇静剂。您将会向左侧卧躺，把膝盖提向胸前，以便医生检查。这种姿势将有助于医生将超声波探头插入您的肛门。


您的医生首先会在超声波的探头上涂抹润滑剂，然后再将超声波的探头轻柔的置入您的直肠。直肠超声波和活体组织检查将同步进行。

在进行活组织检查时，您可能会听到一些声音及身感不适。通常不适将会在检查结束前缓解。

因为医生已经给病人使用镇静药物和止痛药物，病人一般不会感到不适。

医生将会采集多个样本，从而提高发现癌症的机会。

我们将在这个过程未进行前使用抗生素以降低感染的可能性。



检查完毕后我需要注意些什么？

尿液、粪便或精液内出现血丝是很常见的，这些症状会逐渐缓解。您必须在检查后的一至两天摄入充足的水份。

在活体组织检查后，您可能在排尿时感到疼痛。这也会在一段时间后逐渐缓解。止痛药如斑纳杜能够缓解这些不适。

在活体组织检查过后，您可能会不能排尿。在这种情况下，我们会把导尿管插入您的体内把尿液排出。

如果您发高烧，我们建议您马上回到医院就诊。

在检查结束后，医生将让您服食抗生素来减低感染的风险。您必须按医生的指示服用抗生素。

如果您的身体状况良好，您将可以在检查的当天出院。

如果您有以下症状，您可以在工作时间拨 6788 8833 与我们的专科诊所联系或马上到急诊室就诊。

- 持续，严重或者不断加重的出血
- 无法排尿
- 发热寒颤

