

Medication Information Leaflet

Acetazolamide

乙酰唑胺

病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Acetazolamide 用于控制癫痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。它也可用于预防高山症，排水（水肿），降低眼压。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

如一般的药物，服用此药也会导致一些常见的副作用。但也不是所有病人会得到这些副作用。若这些副作用持续数日，或影响日常作息，请向医生质询。常见的副作用包括：

- 头晕
从坐姿或卧姿慢慢起身。
- 嗜睡、疲倦。
若服用其他药物要特别小心，伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑轿车或其他类似活动时，家长必须谨慎督促。
- 腹泻
多喝水以补充多些水分。
- 恶心、呕吐。
先吃些食物后才服用此药物。
避免过于油腻，辛辣或味道过重的食物。
- 头痛
可服用 paracetamol 来缓解头痛。
- 食欲不振、腹痛、影响味觉。
- 容易晒伤
涂防晒霜或穿长袖或长裤以保护皮肤。
- 急躁、紧张，易兴奋。
- 乏力、肌肉协调欠佳、手脚麻痹。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用，请立即通知医生或到急诊部求医：

- 严重皮疹，皮肤发红、发痒或脱皮

- 史蒂芬斯-强森症候群是一种罕见，严重的副作用。它的主要特症包括了脸部浮肿，皮肤出现水泡与红疹，红疹会于数小时或数日扩散开。
- 这些症状通常发生在治疗的前几个月（请在治疗的前3个月密切观察）。
- 由于这些症状会迅速恶化，一旦病患出现皮肤的症状时，应马上求医。
- 视线持续模糊、眼部疼痛。
- 排尿困难或疼痛，或排尿出血。
- 皮肤或眼睛泛黄，尿液呈深色（黄疸）
- 不寻常的出血或淤血。
- 持续发烧、喉痛、口疮
- 代谢性酸中毒的症状如思绪混乱，呼吸急促，心跳急快，胃痛，持续的嗜睡，气喘或感觉疲累乏力。

药物过敏的症状包括：

- 脸部/眼睛/嘴唇/舌头浮肿
- 呼吸困难
- 全身出现发痒的皮疹

若您在服用此药后出现以上症状，请停止服用并立即求医。

开始服用此药前要遵守哪些预防措施？

在开始服用此药之前，如果您有以下疾病，请告知您的医生：

- 磺胺（Sulfonamide）过敏
- 药物过敏的病史
- 肾脏、肝脏问题
- 肾结石病史

服用此药时必须避免哪些食物或药物？

服用此药时避免饮酒，因为它会导致过度嗜睡和头晕的症状。

如何服用此药？

- 请遵守标签上的指示，按照医生所开的剂量服药。
- 此药可以在饭前或饭后服用。

忘记或漏服药该怎么办？

请立即补服药物。若已接近下次服药的时间，请勿补服而该依照下次服药的时间服药。请勿连服两剂或自行增加剂量。

此药应如何存放？

- 请置于儿童不易触及之处。
- 置放在阴凉、干燥的地方。

此药应如何扔掷？

- 扔药之前请包裹在垃圾带里，再丢进垃圾桶。



SingHealth

Version 2

Last Review: 27/05/2022

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®