

Xarelto[®]

利伐沙班 (Rivaroxaban) 药片

病人资料单张

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

利伐沙班(Xarelto[®]) 是一粒圆状药丸。剂量分为2.5毫克(mg)，10毫克(mg)，15毫克(mg)和20毫克(mg) (请在适当的选框打勾)。

<input type="checkbox"/> Xarelto [®] 10mg 	<input type="checkbox"/> Xarelto [®] 15mg 	<input type="checkbox"/> Xarelto [®] 20mg 
---	---	---

什么是创新的口服抗凝血剂 (direct-acting oral anticoagulants (DOACs))?

利伐沙班 (Rivaroxaban) 是一种创新的口服抗凝血剂 (direct-acting oral anticoagulants (DOACs))，即新一代薄血药。

利伐沙班 (Rivaroxaban) 用于抑制血块的形成，以及防止已形成的血块继续扩大。但它并不能化解已形成的血液凝块，这些血块须由身体自然化解。

您不需要经常抽血检验以确保药物的功能。您的医生可能会检验您的肾或肝功能。如您有肾或肝衰歇，您不适合服用利伐沙班 (Rivaroxaban)。

为什么要服用利伐沙班 (Rivaroxaban)?

医生要您服食此药是基于以下其中的病况 (请在适当的选框打勾):

- 预防中风因为心律失常)
- 预防血液结块在髋关节或膝盖置换手术
- 治疗或深静脉血栓 (血液结块在脚血管)
- 治疗或预防肺部内血液结块

其他: _____

治疗期因病况而异，有些需要三到六个月或更长久的治疗。

如何服用利伐沙班 (Rivaroxaban)?

- 利伐沙班 (Rivaroxaban) 需饭后服食。
- 如果您无法吞下利伐沙班 (Rivaroxaban) 药片，您可压碎成粉状服食。
- 每天按时在同一时间服用利伐沙班 (Rivaroxaban)，按照您医生的指示。除非是您的医生或药剂师的吩咐，不然切勿忘记吃药，加倍服用，自行更改或停药剂量。
- 您必须知道利伐沙班 (Rivaroxaban) 的图像，剂量和给您的用处。
- 请时常确保储存的份量足够。

何时服用利伐沙班 (Rivaroxaban)?

您必须按医生的规定服用利伐沙班 (Rivaroxaban)，每日服用一次或两次。它需饭后服食。

忘了服食利伐沙班 (Rivaroxaban) 该怎么办?

如果您服用利伐沙班 (Rivaroxaban) 如下：

- 一天只服用一次：马上吞服药片。您可在明天平常服用时间服用吞服同样的剂量。在同一天里，请不要加倍剂量服用。
- 如果您一天服用两次：尽快服用此药以便确保您一天的服食量是30毫克。您可同时服食两片利伐沙班15毫克。您可在明天平常服用时间服用吞服同样的剂量。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

- 服用利伐沙班 (Rivaroxaban) 常见的副作用包括过敏反应，反胃，腹痛，背痛或四肢疼痛。
- 利伐沙班可能会造成流血现象的副作用如：
 - 在未受伤的情况下，出现流鼻血的症状
 - 刷牙时，牙龈出血
 - 割伤后，用加压10-15分钟后仍无法止血
行动方案：如血流15分钟后仍无法止血或您觉得不舒服，请与您的医生征询。
 - 女性经血过量
行动方案：服用利伐沙班 (Rivaroxaban) 时，女性经血将会比往常较多。如您觉得不舒服，请与您的医生征询。
- 服用过量利伐沙班 (Rivaroxaban) 时所导致的严重副作用包括：
 - 尿液有血或呈深暗、污浊颜色
 - 粪便呈黑黏状（没有服食铁片素）
 - 咳嗽时咯血或呕吐出类似咖啡渣的色物
 - 在未受伤的情况下，皮肤出现大片的淤伤
 - 突然严重头痛和呕吐或神智不清
行动方案：如有以上症状或您觉得不舒服，请即刻通知您的医生或马上到医院的紧急部门寻求医治。

服用利伐沙班 (Rivaroxaban) 时有什么特别的预防措施?

- 若认为自己已怀孕, 可能会怀孕或正在哺乳, 请立即向医生说明。您不可服用利伐沙班 (Rivaroxaban) 如果您怀孕或正在哺乳。
- 若您的病情或药物有任何改变, 服用新的或替换草药或营养食品, 请务必通知您的医生或药剂师
- 您会比较容易流血。刷牙时使用柔软的牙刷。当您使用剃刀或其它尖锐物体时, 请加倍小心。
- 如您需动手术或牙科手术/治疗, 请务必告知您的医生、牙医或药剂师您正在服用利伐沙班 (Rivaroxaban)。您可能需要在手术前停服利伐沙班 (Rivaroxaban)。

- 若您有任何疑问, 请联络以下的药房, 电话: _____

您应该如何保存药物?

- 请将药物放在阴凉, 干燥, 避免阳光直接照射的地方。
- 利伐沙班 (Rivaroxaban) 需储存在原装片里。勿和别的药片储放在同一个储存罐如药丸盒里。
- 把药物存放在儿童拿不到的地方。



SingHealth

Version 1

Last Review: 30/06/2017

Produced by Department of Pharmacy
of National Heart Centre of Singapore
and

Singapore General Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®